


Table of contents

Medication Safety Alert (เพื่อระวังความคลาดเคลื่อนยา): ยาชื่อพ้อง มองคล้าย (LASA drugs) หน้า 1
 Informations Update (ข้อมูลข่าวสาร): ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับยา Cinnarizine, Flunarizine หน้า 2



Medication Safety Alert

เพื่อระวังความคลาดเคลื่อนยา



LASA drugs



ยามองคล้าย

(Look-alike drugs; LA drugs)

คือ ยาที่มีรูปร่างเม็ดยา หรือลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน ทำให้เกิดความสับสนได้ง่าย

การจัดการของกลุ่มงานเภสัชกรรม

- มีนโยบายเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่รูปลักษณ์ต่างกัน เพื่อป้องกันความผิดพลาดตั้งแต่จุดเริ่มต้น

ตัวอย่างรายการยามองคล้าย ที่มีใน sw. จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์



ยาชื่อพ้องมองคล้าย หรือ LASA drugs เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา (medication errors) ได้ในหลายขั้นตอนของระบบยา ตั้งแต่ การสั่งจ่ายยา (prescription error) การคัดลอกคำสั่งจ่ายยา (transcribing error) การจ่ายยา (dispensing error) และการบริหารยา (administration error) ซึ่งมีความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ป่วย (patient safety)²

เอกสารอ้างอิง

1. กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์. (2567). มาตรการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2567). กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.
 2. ปิยะวัน วงษ์บุญหนัก. (2561). สถานการณ์ยาชื่อพ้องมองคล้ายในประเทศไทย. วารสาร มวก.วิชาการ, 22(43-44), 205-216. (p. 206)

ยาชื่อพ้อง

(Sound-alike drugs; SA drugs)

คือ ยาที่มีชื่อคล้ายกัน ออกเสียงคล้ายกัน เขียนคล้าย รวมถึงเป็นยาชนิดเดียวกันแต่มีหลายความแรง

การจัดการของกลุ่มงานเภสัชกรรม

- แยกเก็บยาที่มีชื่อคล้ายกัน โดยไม่เรียงตามตัวอักษร
- ชื่อยาที่ผิดบ่อยอยู่เรียงกันในคอมพิวเตอร์ให้ใช้สัญลักษณ์เตือน หรือใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะส่วนที่แตกต่างให้เห็นชัดเจน (**TALL-MAN LETTERS**) เช่น Clo**Z**APine, Alpra**Z**OLAM

รายการยา LASA drug sw. จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

Clonazepam (0.5)	&	Clonazepam (2)
LOR azepam (1)	&	LOR azepam (2)
Sertraline (50)	&	Trazodone (50)
LOR azepam (2)	&	Fluoxetine (20)
Amitriptyline (10)	&	Mianserine (10)

(ข้อมูลล่าสุด มิถุนายน 2566)

Information Update ข้อมูลข่าวสาร

“ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 22 มกราคม 2569”
แจ้งตำรับยา **ฟลูนาไรซีน (flunarizine)** หรือ **ซินนารีซีน (cinnarizine)**
ต้องระบุคำเตือนติดฉลากยา และต้องมีคำเตือนในเอกสารกำกับยา ดังนี้

คำเตือนในฉลากยา

- ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
- ไม่ควรใช้ยาฟลูนาไรซีนร่วมกับยาซินนารีซีน
- ระมัดระวังการใช้ยานี้ เพราะอาจทำให้เคลื่อนไหวช้า แข็งเกร็ง มือสั่นขณะอยู่เฉย ทรงตัวลำบาก และซึมเศร้า

คำเตือนในเอกสารกำกับยา

- ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
- ไม่ควรใช้ยาฟลูนาไรซีนร่วมกับยาซินนารีซีน เนื่องจากอาจไม่ปลอดภัย
- ระมัดระวังการใช้ยานี้ เพราะอาจทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น เคลื่อนไหวช้า แข็งเกร็ง มือสั่นขณะอยู่เฉย ทรงตัวลำบาก (Parkinsonism หรือ Extrapyrimal syndromes) และอาการซึมเศร้า
- กรณีต้องใช้ยานี้ต่อเนื่องเกิน 2 สัปดาห์ ให้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้ง่วงนอน

หน้า ๘
เล่ม ๑๔๓ ตอนพิเศษ ๓๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน ฉบับที่ ๗๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๖ (๙) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการยา ในการประชุมครั้งที่ ๔๒๒-๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และการประชุมครั้งที่ ๔๒๖-๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๗๘) ของข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๓

“(๗๘) ตำรับยาฟลูนาไรซีน (flunarizine) หรือซินนารีซีน (cinnarizine) ชนิดรับประทาน สำหรับมนุษย์

คำเตือนในฉลาก

- ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
- ไม่ควรใช้ยาฟลูนาไรซีนร่วมกับยาซินนารีซีน
- ระมัดระวังการใช้ยานี้ เพราะอาจทำให้เคลื่อนไหวช้า แข็งเกร็ง มือสั่นขณะอยู่เฉย ทรงตัวลำบาก และซึมเศร้า

คำเตือนในเอกสารกำกับยา

- ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
- ไม่ควรใช้ยาฟลูนาไรซีนร่วมกับยาซินนารีซีน เนื่องจากอาจไม่ปลอดภัย
- ระมัดระวังการใช้ยานี้ เพราะอาจทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น เคลื่อนไหวช้า แข็งเกร็ง มือสั่นขณะอยู่เฉย ทรงตัวลำบาก (Parkinsonism หรือ extrapyramidal syndromes) และอาการซึมเศร้า

๔. กรณีต้องใช้ยานี้ต่อเนื่องเกิน ๒ สัปดาห์ ให้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

๕. ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้ง่วงนอน”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

พัฒนา พร้อมพัฒน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข



ตัวอย่างเม็ดยา
flunarizine



ตัวอย่างเม็ดยา
cinnarizine

**ปัจจุบันรายการยาของ
สว. จิตเวชนครราชสีมาราชชนินทร์
ไม่มี
flunarizine และ cinnarizine**

